

CITIKOLIN

V LIPOZOMÁLNÍM OČNÍM ROZTOKU

Omkl¹-LF[®]

Citikolin a kyselina hyaluronová

Přídatná léčba pro pacienty s glaukem

BEZ KONZERVANTŮ

1 kapka
3x denně



Zdravotnický prostředek



Citikolin a kyselina hyaluronová

Sterilní lipozomální oční roztok

Lahvička 10 ml e

Složení:

Sodná sůl citikolínu*, sodná sůl kyseliny hyaluronové, hydrogenované fosfolipidy, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, vysoce čistěná voda.

* Citikolin – Kyowa Hakko Bio, Japonsko.

Co je Omk1®-LF

Omk1®-LF je zdravotnický prostředek třídy IIa.

Omk1®-LF je oční roztok obsahující 2 % citikolínu a 0,075 % kyseliny hyaluronové o vysoké molekulové hmotnosti v lipozomálním roztoku, který má funkci nosiče pro citikolin. Díky přítomnosti citikolínu poskytuje Omk1®-LF užitečnou a prospěšnou strukturální podporu při obnově celistvosti membrán buněk postižených očními degenerativními procesy, jakým je například glaukom.

Roztoky obsahující kyselinu hyaluronovou navíc umožňují vytvořit vhodné mikroprostředí pro reparační procesy na povrchu oka v případě poškození rohovkového a spojivkového epitelu. Kyselina hyaluronová, která je získávána biotechnologickou výrobou, totiž dodává roztokům mukomimetické, mukoadhezivní a viskoelastické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou prospěšné pro zlepšení stability slzného filmu, který udržuje povrch oka lubrikovaný, hydratovaný a chráněný.

Kdy se Omk1®-LF používá

Díky přítomnému citikolínu a jeho vlivu na strukturu ganglionových buněk sítnice je Omk1®-LF určen jako přídatná léčba k léčbě snižující nitrooční tlak u pacientů s glaukolem.

Hydratační a ochranné vlastnosti výrobku poskytují úlevu pro oči v případě podráždění, pálení a pocitu cizího tělesa v oku, které jsou způsobeny faktory životního prostředí, v důsledku operace očí nebo zánětu spojivek.

Jak se Omk1®-LF používá

1 kapka 3× denně, podle potřeby.

Bezpečnostní opatření a upozornění

Před použitím protřepejte. Po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění. V případě používání jiných místně působících očních léků je potřeba dodržet od aplikace interval 10 - 15 minut. Po prvním otevření přípravek spotřebujte do 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C a chráňte před přímým slunečním zářením.

Omk1®-LF je mezinárodně patentově chráněno pro společnost Omikron Italia s.r.l.

Tento materiál je určen pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

OMK-LF_DL_02_08_23



Výrobce:

Omkron Italia S.r.l.
Viale B. Buozzi, 5
00197 Řím, Itálie



Distributor:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Přísnická 22, 142 00 Praha 4
Česká republika