

Citikolin v očním roztoku

Omk2[®]

Citikolin, vitamin B12 a kyselina hyaluronová

**Přídavná léčba pro pacienty
s počínající diabetickou retinopatií**

Sterilní oční roztok

*1 kapka
3x denně*



Citikolin v očním roztoku

Omk2®

Citikolin, vitamin B12 a kyselina hyaluronová

Sterilní oční roztok

Lahvička 10 ml e

Složení:

Sodná sůl citikolinu, kyanokobalamin (vitamin B12), kyselina hyaluronová, monohydrát fosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, voda pro injekce.

Co je Omk2®

Omk2® je zdravotnický prostředek třídy IIa.

Omk2® je oční roztok obsahující 2 % citikolinu, 0,05 % vitamínu B12 a 0,2 % kyseliny hyaluronové o vysoké molekulové hmotnosti.

Díky přítomnosti citikolinu poskytuje Omk2® užitečnou a prospěšnou strukturální podporu při obnově celistvosti membrán buněk postižených očními degenerativními procesy, jakým je například počínající diabetická retinopatie.

Kyanokobalamin (vitamin B12) navíc chrání buňky před volnými radikály a podporuje růst epitelových buněk rohovky.

Díky přítomnosti kyseliny hyaluronové a jejím mukoadhezivním a viskoelastickým vlastnostem umožňuje Omk2® vytvořit vhodné mikroprostředí pro reparační procesy na povrchu oka v případě poškození rohovkového a spojivkového epitelu, zlepšuje stabilitu slzného filmu a udržuje tak povrch oka lubrikovaný, hydratovaný a chráněný.

Přípravek obsahuje 0,01 % benzalkonium-chloridu.

Kdy se Omk2® používá

Díky přítomnému citikolinu a jeho vlivu na strukturu gangliových buněk sítnice je Omk2® určen pro pacienty s počínající diabetickou retinopatií.

Kromě toho Omk2® díky přítomnosti vitamínu B12 nepřímo podporuje fyziologické procesy reepitelizace rohovky po operaci oka, laserovém zákroku nebo malých oděninách povrchu rohovky.

Hydratační a ochranné vlastnosti Omk2® navíc poskytují úlevu pro oči v případě podráždění, pálení a pocitu cizího tělesa v oku, které jsou způsobeny faktory prostředí nebo dlouhodobým sledováním obrazovek.

Jak se Omk2® používá

Používá se 1 kapka 3× denně.

Bezpečnostní opatření a upozornění

Při užívání jiných místně působících očních léků se doporučuje rozestup 10-15 minut. Uchovávejte přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek je určen pouze pro vnější oční použití. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Omk2® je mezinárodně a národně patentově chráněno pro společnost Omikron Italia S.r.l.



Výrobce:

Omikron Italia S.r.l.
Viale B. Buozzi, 5
00197 Řím, Itálie



Distributor:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22, 142 00 Praha 4
Česká republika